




<当院へのアクセス>

- JR高知駅から西へ800m
- とさでん交通バス 愛宕町1丁目下車すぐ
- 高知ICより車で約12分



- ❖ 受診をご希望の場合は、事前にご予約いただくことをおすすめしています。下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ・ご予約】

医療法人新松田会 愛宕病院 脳神経外科外来

〒780-0051 高知市愛宕町1丁目1-13

TEL 088-823-3301(代)

アルツハイマー病治療薬

抗アミロイドβ抗体薬

レケンビ®・ケサンラ®に関する 診療のご案内



「最近もの忘れが気になる」

「アルツハイマー病かも？」

そんなお悩みをお持ちの方へ

愛宕病院

アルツハイマー病治療薬

レケンビ®・ケサンラ® 治療について

抗アミロイドβ抗体薬 レケンビ®・ケサンラ®とは？

レケンビ®(一般名:レカネマブ)とケサンラ®(一般名:ドナネマブ)は、「アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)」ならびに「アルツハイマー病による軽度の認知症」の進行を抑制する効能・効果が認められています。作用機序はそれぞれ異なりますが、いずれも脳内に蓄積したアミロイドβを取り除く作用があります。その結果、アルツハイマー病の進行を遅らせる効果が期待されています。愛宕病院 脳神経外科では、厚生労働省が定める「最適使用推進ガイドライン」に基づき、安全に投与できる体制を整えています。

治療の対象者は？

「アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)」および、「アルツハイマー病による軽度の認知症」の方に限定されています。初診時に、診察および検査を行い、治療の適応か否かを判断します。治療の対象外と判断された場合には、他の治療法を提案します。

どんな副作用がありますか？

■点滴に伴う副作用

治療の初期に、頭痛、寒気、発熱、吐き気、嘔吐などの症状が現れることがあります。

■注意が必要な副作用

【アミロイド関連画像以上(ARIA)、脳出血】

脳のむくみや脳の中で出血が起こることがあります。ARIAの有無はMRI検査で確認することができるので、定期的に検査を行います。検査の結果、重症度によっては治療を中断または中止することができます。

【重篤な過敏症(アナフィラキシーを含む)】

関連する症状には、赤い湿疹、寒気、吐き気、嘔吐、汗をかく、息苦しいなどがあります。

治療までのスケジュール



医療費について

治療費は高額になることがあります。高額医療制度の利用によって、自己負担額を軽減することができます。

■高額医療制度

医療機関や薬局の窓口で支払った、同一月の自己負担額が上限額を超えた場合にその超えた金額を支給し、医療費負担を軽減する制度です。

医療費に関するご相談は、医事課(総合受付)で承ります。

投与スケジュール

| | レケンビ® | ケサンラ® |
|---------|-------|---------|
| 受診頻度 | 2週間ごと | 4週間ごと |
| 1回の治療時間 | 約1時間 | 30分～1時間 |

- ◆ 初回投与は副反応の観察のため1泊2日の入院が必要です
- ◆ 必要に応じて医師が薬の効果や病気の進み具合などを確認し、治療の継続または中止を判断します。